

ne & ante confectionem in brachijs uinculo interceptis, quum uenam diuidimus condiscere, atq; ad amissum expendere, quam in uenarum sectionibus nostri, si dijs placet, Aesculapij hallu-
cinentur, qui grauiternum humeraria, aut communis, aut axillaris in eadem manu diuidenda
sit, ridicule contententes, humerariam sese aperire existimant, quoties uenam inter pollicem &
indicem aperiunt: & axillarem, si uenam inter anulare & minimum, aut ut alijs arridet, inter me-
dium & anularem incidunt. Ad hæc, quis non conspiciat ipsos in cubito quamcunq; uenam ar-
bitrentur referendam, propemodum nullam præter axillaris uenæ^m ramum ad communem
uenam exporrectum incidere: Cæterum ut in extremæ manus cute etiam in eodem homine ue-
narum distributio uariet, pari quoq; ratione & in cubito subinde uenarum propagines diuer-
sas uidere est. Interdum enim² duarum mediarum ad communis uenæ generationem concur-
sus non in cubiti sit flexu, sed multo humilior, nō procul à medio longitudinis cubiti. Aliquan-
do humeraria ramus communem accedens occulitur, axillaris ramo uisum non fugiente. Non
nunquam rursus contraria est ratio. Contingit etiam nō semel, axillaris ramum, qui ad commu-
nem fertur, humeraria ramo longe aut graciliorem aut ampliorem esse, & interdum hunc aut il-
lum geminum uideri. Quandoq; (& id non infrequenter)³ tertius humerariae ramus exter-
nam cubiti sedem accedens, omnino deest, ipsius uicem tunc suppletibus ramulis, qui à⁴ com-
muni uena in cutem excurrunt, ac subinde etiam ab axillaris ramo, qui toti ulnæ longitudini p-
exporrigitur.

Venarum se-
nem crebro
uariate.

VENAE CAUAE PORTIONIS AD PAR-
tes infra septum transuersum locatas distributæ series. Cap. IX.



Ad sinistram
renem inuolu-
tum uena.


Ad dextrum
renem inuolu-
tum.

Ad renes ue-
nas.

Sinistram semi-
nalis uenae se-
ries.

REQVENTES sanè & insignes admodum propagines etiam à cauæ
portione sub iecore lumborum uertebreis exporrectæ pululant, quæ in
hunc se habent modum. Simulatq; caua secundum posteriorem iecoris se-
dem deorsum propens, nō amplius iecori cōnascitur, nō nihil obliqua
ex dextris quodammodo corporis partibus introrsum, ad mediū uideli-
cer dorsū fertur, illico¹ ramum nō admodum grandē ex sinistro latere pro-
mēs, qui potissimū numerosa uenularū serie in pingue mēbranamq; sinis-
tri renis tunicā digeritur, quæ à peritonæo pronata, renē inuestit, eundemq; dorso alligatū con-
tinet. Hic ramus infrequenter ex dextro cauæ caudicis latere, uenā coniugē adipiscitur. Quan-
doquidem² uena dextri renis pingue tunicā conterminasq; peritonæi sedes accedēs, nō à cauæ
caudice principiū ducit, sed ab elatiori regione³ eius uenæ qua dextro reni serofus sanguis de-
portatur. Aliquando interim uena frequenti sobole in sinistro renis tunicam disseminata, ab ea⁴
quæ in sinistram renem proficiscitur, originē sumit, ea quæ dextri renis tunicæ offertur, à cauæ
dextro latere pronata. Cæterum caua ab utroq; latere⁵ amplissimā propaginem, ubi iam mediæ
uertebrearum sedi innititur, in renes distribuit, dextrā quidem propaginē dextro reni, sinistram
autem sinistro deriuans. Atq; ut situs renū uariis est, ita quoq; harum propaginū exortus ē di-
recto sibi nequitia correspondet, quum enim dexter ren (ut plerunq; accidit) sinistro elatius lo-
cetur, dextri lateris propago altius quàm sinistri renis principiū ducit. Si uerò sinister ren dex-
tro superior sit (quod etiam crebrius quàm disseccionum professores tradunt, euenit) propago
quoq; in ipsum à caua transuersim quodammodo repens, elatius quàm dextra propago prin-
cipium ducit. Quamobrē uerò harum propaginum ortus nunq; ē directio inuicē opponatur,
in quinto libro, qui renū functiones pertractabit, cōmemorabitur. Præfens enim sermo cauæ
ramorū distributioni potissimum est dedicandus. Venæ itaq; ad utrumq; renē protensa, gran-
des admodū sunt, ac quamprimū concauā renū sedē contingunt; hominibus in⁶ duos ramos⁷
partiunt, ac dein in renū substantiā mirabili quodā artificio hætenus nemini Anatomicorū co-
gnito cōgerunt, quod nam uerò id sit, in quinto libro perstringā. Cæterum priuatim ab humi-
liori sede⁸ uenæ eius quæ sinistram renē petit, iuxta ductus ipsius ferē mediū, uena pronascit in
uiris ad sinistram testem tota excurrēs, præterq; quod graciles⁹ exiguosq; surculos in peritonæo
quā porrigitur, ac in mēbranas tunicas uel sinistram testē & seminaria ipsius uasa ambientes pro-
ducit. Hæc enim uena peritonæo, quā id lumborū¹⁰ carnibus inferniē adnata, deorsum super
pubis os fertur: quod quū superauit, atq; ex magni peritonæi amplitudine elabatur, in¹¹ uarios
anfractus gyrosq; conuoluitur, quorū basis superiori testis sedi cōnata, ramulos in tunicā testis
substantiā proximē continentē digerit, & alijs frequentioribus ramis in testis substantiā passim
disseminatur. quemadmodū quintus liber, ubi generationis organa persequar, diffusius doce-
bit. Vena hæc sinistram testem accedens, aliquando propaginem à cauæ caudice sub uenæ ad si-
nistram

nistram renem exporrectæ principio enatum
asciscit: quæ nō procul ab exortu sinistrorsum
declinans propens, cum illa coit, unaq; semina-
lis uena ex ambabus confurgit.¹² Vena autem
dextrum accedēs testem, non à¹³ uena in dex-
trum renem protensa originem sumit, at à ue-
næ caudice aliquanto inferius, quàm uenæ re-
nibus exporrectæ principium ducunt. Huius
seminalis uenæ exortus, non ut reliquarū ferē
propaginum in cauæ consistit latere, uerum
ex ipsius eminentiori seu anteriori sede, uersus
dextrum latus nonnihil hæc seminalis uena ex-
tuberanti ac ueluti rotunda origine enascitur.
Præfens uenæ ramulum quoque ex ea quæ in
dextrum renem procurrat accessisse, ac simul
cum ea coiuisse, Galenus sibi semel obseruauit
testatur. Ego quoque totam dextri testis uenā
à uena quæ reni offertur pronatam semel uidi.
Quod uerò hæc uena dextrum testem ea se-
rie adeat, qua sinistram sinistro testi porrigi dicebam, uel me tacente, cuius obui-



In mulieribus alia harum uenarum est distributio. Quamuis enim illis par cum
sit exortus, ipsæ tamen magna ex peritonæi amplitudine haud elabuntur, in
ossa pertingunt. Verum ad mulierum testes pinguibus membranarum suffi-
cit, non uniuersæ in seminaria uasa degenerantes, aut totæ in testes exhaustæ,
quam ad testes deueniunt, utriusque lateris uena bipartitur, ac una portio
testis implicitæ modo, seminariū uas efficitur. Altera uerò in membranas quæ
intertextæ, in uteri latera digeritur, elatiorē ipsius fundi sedem potissimum
ter feminales uenas caua ubi lumborum uertebreis ipsi quæ magnæ arteriæ cō-
iunguntur, inferius sede quæ uertebreis spectat, uenas geniculatim diffundit, per
os uertebrearum lateribus exculpta ad dorsalem medullam digestas, & ramos cō-
iungit in musculis uertebreis adnatos, à quibus rursus aliæ soboles in abdominis
musculis latius ad abdominis usque latera descendentes, & illis quas perreptant
sedibus pedicantes. Quum primū uerò caua ad sacri ossis usque summum descen-
derit, magnæ arteriæ (quæ ipsi prius ad sinistram subijciebatur) tanquam digniori
quo minus arteria ossis sacri duritia in dorsi motibus molestaretur, caua ipsi ar-
nit in duos æquales partitur truncos, quorum hic dextro cruri, ille sinistro (ubi
do dicam de promptere soboles) offeruntur. Sinister enim truncus (quod &
non dicatur, per reliquam cauæ seriem intelliges) statim in ipsa partitione, aut
in duos truncos supra os sacrum diuiditur, ab exteriori ipsius latere uenam p-
rjs quas ad lumborum uertebreis & abdominis musculis, & alios ibidem dori
seminari diximus. Vena hæc interdum ante cauæ supra os sacrum partitionē
cens, transuersim lumborum carnibus infernitur, ipsi & peritonæo abdo-
lis ramulos dispergens, & in canibus multo quàm in hominibus manifestior
sinister truncus hanc deriuauit uenam, oblique deorsum uersus exteriora fertur
dextri lateris trunco A literæ aut Y in hunc modum X inuersi non absimi-
& aliquot surculos superioribus sacri ossis foraminibus offerens. Deinde n-
su in duos impares ramos finditur, interior nanque gracilior est exterior: ac
propagines, quarum alteram interiorē, alteram exteriorē manifestiori-
tia, dum Anatomen ostendo, appellare consueui. Exterior itaque propago to-
do inter sacrum & coxendicis os, quā maximus neruorum crus petentium-
riora transuersim fertur, & numerosa ramorum serie in omnes musculis ab ili-
sede pronatos, femorisq; motibus famulantes dispensatur, ramulos etiam deo-
los diffundens, qui ab inferiori coxendicis ossis sede principium ducunt, atq; it-
dicis ossis cum femore posterior sedes, et clunium cutis hac exteriori propagin-
tur. Interior autem propago ab interiori ipsius latere exiguas soboles sacri o-
minibus dispēsat, & alias his maiores in recti intestini musculis, cutemq; orbi-
sculo obnatam digerit, quæ feculentum sanguinem per anum expurgant, si quæ-